

obsidan®



Obsidan Fe⁺⁺ 100 mg -rautalääkekapseli

Obsidan-kapseli on suun kautta otettava rautalääke. Kapseli sisältää 100 mg kaksiarvoista rautaa. Raudan lisäksi kapseli sisältää apuaineena muun muassa c-vitamiinia (askorbiinihappo).

Obsidan Fe⁺⁺ 100 mg kapselit sopivat aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Kapseleita käytetään raudanpuutostilojen hoitoon ja erityisesti raskauden ja imetyksen aikana, lapsuudessa ja vähärautaisen ruokavalion yhteydessä esiintyvän raudanpuuteanemian hoidossa.

Rauta ruuan ja juoman kanssa

Parhaan tehon rautalääkkeestä saa ottamalla kapselit tyhjiin vatsaan aamulla noin 1 tunti ennen ateriaa tai myöhemmin päivällä noin 2 tuntia ennen tai jälkeen aterian. Tämä johtuu siitä, että monet ruoan ainesosat huonontavat raudan imeytymistä.

Jos tyhjään mahaan otettuna ruoansulatuskanavan oireet estävät lääkkeen käytön,

voidaan kapselit kuitenkin ottaa aterian yhteydessä. Tällöin tulee välttää kasvisruokia, maitotuotteita, kahvia ja teetä.

Miten Obsidan-kapseleita käytetään

Kapselit niellään runsaan veden kera pureskelematta, jotta kapselien sisältämä rauta vapautuisi vasta ohutsuolen alkuosassa, ja mahalaukun ärsytysoireet olisivat mahdollisimman vähäisiä.

Jos kapselien nieleminen osoittautuu liian vaikeaksi, voidaan kapseli varovasti avata ja tyhjentää sen sisältämät rakeet ruokalusikkaan ja ottaa ne siitä pureskelematta riittävän runsaan vesimäärän kera.



Obsidan-rautalääkkeen annostelu

Ota Obsidan Fe⁺⁺ 100 mg kapseleita juuri siten kuin pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkäri/apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista jos olet epävarma.

Suosittelun annos on:

1 kapseli päivässä aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille (paino vähintään 20 kg). Vaikeaan raudanpuutokseen yli 15-vuotiaille nuorille (paino vähintään 50 kg) ja aikuisille suositellaan hoidon aluksi seuraavaa annostelua:

- 50 - < 60 kg painaville suositusannos yksi kapseli 2 kertaa päivässä
- ≥ 60 kg painaville suositusannos yksi kapseli 2–3 kertaa päivässä.

Älä käytä Obsidan Fe⁺⁺ 100 mg kapseleita, jos:

- olet allerginen ferroglysiinisulfaatile tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle
- sinulla on ruokatorven ahtauma
- sinulla on jokin veren rauta-arvoja kohottava sairaus (esim. hemokromatoosi tai krooninen hemolyyysi)
- sinulla on jokin sairaus, jossa raudan käyttö on häiriintynyt (esim. sideroblastinen anemia, lyijyanemia tai talassemia)

- olet hoidossa, jossa tehdään toistuvia verensiirtoja.

Valmistetta ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille. Valmistetta ei saa antaa 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka painavat alle 20 kg.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset: mahavaivat, ummetus, ripuli, oksentelu, pahoinvointi, närästys, ulosteiden värjäytyminen tummaksi (vaaratonta, johtuu ulosteeseen joutuvasta raudasta). Harvinaiset: hampaiden värjäytyminen, ihon yliherkkyyss-reaktiot. (Jos yliherkkyyssreaktio on voimakas, on syytä hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.) Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): mahakipu, ylävatsakipu, ruuansulatuskanavan verenvuoto, kielen värjäytyminen, suun limakalvojen värjäytyminen, äkilliset vaikeat yliherkkyyss-reaktiot.

Lisää tietoa löydät pakkausselosteesta.

Lähde: Obsidan-pakkausseloste.

UCBCares®

Kysyttävää UCB:n lääkevalmisteista? Ota yhteyttä:

- 0800 9 13353 (maksuton numero)
- +358 9 4273 3300 (maksullinen numero)
- UCBCares.FI@ucb.com
- www.ucbcares.fi

Obsidan Fe⁺⁺ 100 mg kapseli, kova.

Raudanpuutostilojen hoitoon, erityisesti raskauden ja imetyksen aikana, lapsuudessa, vähärautaisen ruokavalion yhteydessä. Akuutin tai kroonisen verenhukan aiheuttaman raudanpuutteen hoitoon. Yli 6-vuotiaille lapsille (paino vähintään 20 kg), nuorille ja aikuisille 1 kapseli päivässä suun kautta tyhjään vatsaan. Ei sovellu käytettäväksi tiettyjen veri- tai ruuansulatuskanavan sairauksien eikä toistuvien verensiirtojen yhteydessä. Ruoka ja muut lääkkeet saattavat vaikuttaa raudan imeytymiseen ja rauta voi vaikuttaa muiden lääkkeiden imeytymiseen. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Yleiset haittavaikutukset: mahasuolikanavan oireet. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: UCB Pharma Oy Finland, puh. 09-2514 4221, ucb.finland@ucb.com.

Perustuu 13.02.2024 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.